

核准日期: 2007年01月18日
修改日期: 2022年12月28日
2025年09月15日



静注人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警 示

因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险，临床使用时应权衡利弊。

- 【药品名称】** 通用名称：静注人免疫球蛋白
英文名称：Human Immunoglobulin for Intravenous Injection
汉语拼音：Jing Zhu Ren Mianyiqiudanbai
- 【成 份】** 本品系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，去除抗补体活性并经病毒去除和灭活处理制成。含适宜稳定剂，不含防腐剂和抗生素。
本品使用的辅料：麦芽糖。
- 【性 状】** 本品应无色或淡黄色澄明液体，可带轻微乳光，不应出现浑浊。
- 【适 应 症】** 1. 原发性免疫球蛋白缺乏症，如X连锁低免疫球蛋白血症，常见变异型免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。
2. 继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染，新生儿败血症等。
3. 自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。
- 【规 格】** 1.25g(5%,25ml)/瓶、2.5g(5%,50ml)/瓶、5.0g(5%,100ml)/瓶
- 【用法用量】** 用法：静脉滴注或以5%葡萄糖溶液稀释1~2倍作静脉滴注，开始滴注速度为1.0ml/分（约20滴/分）持续15分
钟后若无不良反应，可逐渐加快速度，最快滴注速度不得超过3.0ml/分（约60滴/分）。
用量：遵医嘱。推荐剂量：
1. 原发性免疫球蛋白缺乏或低下症：首次剂量：400mg/kg体重；维持剂量：200~400mg/kg体重，给药间隔时间视病人血清IgG水平和病情而定，一般每月一次。
2. 原发性血小板减少性紫癜：每日400mg/kg体重，连续5日。维持剂量每次400mg/kg体重，间隔时间视血小板计数和病情而定，一般每周一次。
3. 重症感染：每日200~300mg/kg体重，连续2~3日。
4. 川崎病：发病10日内应用，儿童治疗剂量2.0g/kg体重，一次输注。
- 【不良反应】** 一般无不良反应，极个别病人在输注时出现一过性头痛、心慌、恶心等不良反应，可能与输注速度过快或个体差异有关。上述反应大多轻微且常发生在输液开始一小时内，因此建议在输注的全过程定期观察病人的一般情况和生命特征，必要时减慢或暂停输注，一般无需特殊处理即可自行恢复。个别病人可在输注结束后发生上述反应，一般在24小时内均可自行恢复。
1. 国外临床试验
同类的国外上市产品在超过5%的临床试验受试者中观察到以下常见不良反应：头痛、寒战、发热、疼痛、乏力、背痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、输液部位反应、皮疹、瘙痒、荨麻疹、高血压、低血压、心动过速等。
2. 国内上市后监测
本品及同类的国内上市产品监测到如下不良反应/事件，由于这些不良反应/事件是在无法确定总数的人群中自发报告的，因此不能准确估算其发生率：
（1）全身性损害：畏寒、高热、胸痛、不适、苍白、乏力、眶周水肿、水肿、全身酸痛等。
（2）皮肤及其附件损害：斑丘疹、红斑性皮疹、局限性皮肤反应、表皮松懈、多发性红斑、皮炎（如大疱性皮炎）、出汗增加等。
（3）免疫功能紊乱和感染：过敏反应、过敏样反应、输液反应、过敏性休克等。
（4）心血管系统损害：紫绀、心悸、高血压、心律失常等。
（5）神经系统损害：头晕、昏迷、意识丧失、震颤、肌肉不自主收缩、感觉减退等。
（6）呼吸系统损害：呼吸困难、呼吸急促、呼吸暂停、喘息、喉头水肿、呼吸功能不全、输血相关急性肺损伤、低氧血症等。
（7）血管损害和出血障碍：潮红、静脉炎等。
（8）精神障碍：激越、精神障碍、嗜睡等。
（9）代谢和营养障碍：高血糖。
（10）血液系统损害：白细胞减少、中性粒细胞减少、粒细胞缺乏等。

3. 国外上市后监测

同类的国外上市产品还监测到如下不良反应/事件，由于这些不良反应/事件是在无法确定总数的人群中自发报告的，因此不能准确估算其发生率：

- （1）皮肤及其附件损害：史蒂文斯–约翰逊综合征等。
（2）神经系统损害：癫痫发作、无菌性脑膜炎等。
（3）呼吸系统损害：急性呼吸窘迫综合征、肺水肿、支气管痉挛等。
（4）血管损害和出血障碍：血栓形成等。
（5）血液系统损害：血浆黏度增加、溶血反应等。
（6）泌尿系统损害：肾功能损害等。

【禁 忌】

- 以下患者禁用：
1. 对人免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。
2. 有抗IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

【注意事项】

1. 本品专供静脉输注用。
2. 如有需要，可以用5%葡萄糖溶液稀释本品，但糖尿病患者慎用。严禁用含氯化钠的溶液稀释本品或用于冲洗滴注输液管。
3. 本品呈现混浊、沉淀、异物或瓶子有裂纹、过期失效,不得使用。
4. 本品开启后,应一次输注完毕,不得分次或给第二人输用。
5. 有严重酸碱代谢紊乱的病人应慎用。
6. 监测急性肾功能衰竭患者的肾功能，包括尿素氮、血肌酐和尿量。对于肾功能不全或衰竭的患者，要以最小的速度输注。易感患者使用本品可能引起肾功能异常。
7. 可能发生血栓性事件。监测有血栓形成事件已知危险因素的患者；对有高粘血症风险患者的血液粘度进行基线评估。对于有血栓形成风险的患者，要在最小剂量下缓慢输注。
8. 可能发生无菌性脑膜炎综合征，特别是在高剂量或快速输注时。
9. 可能发生溶血性贫血。监测溶血和溶血性贫血患者的临床体征和症状。

【孕妇及哺乳

期妇女用药】

对孕妇或可能怀孕妇女的用药应慎重，如有必要应用时，应在医师指导和严密观察下使用。

【儿童用药】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】

未进行该项实验且无可靠参考文献。在65岁以上的患者中，一般情况下，不超过推荐剂量，缓慢输注。

【药 物 相

互 作 用 】

本品应单独输注，不得与其他药物混合输用。

【药物过量】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

药理作用：本品含有多钟免疫球蛋白(以IgG为主)，静脉输注后能迅速提高患者血液免疫球蛋白水平，从而增强机体的抗感染（病毒、细菌及其它病原体）能力和免疫调节功能。
毒理研究：尚不明确。

【药代动力学】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮 藏】

于2~8℃避光保存和运输。

【包 装】

包装材料和容器：玻璃瓶，包装规格：1瓶/盒。

【有 效 期】

36个月。

【执行标准】

YBS00982022

【批准文号】

国药准字S20043007 5.0g(5%,100ml)/瓶、 国药准字S20043008 2.5g(5%,50ml)/瓶、
国药准字S20043009 1.25g(5%,25ml)/瓶。

【药品上市许

可持有人】

名 称：深圳市卫光生物制品股份有限公司
注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层

【生产企业】

企业名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司
生产地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号
邮政编码：518107
电话：(0755) 27400800 27404445 传真：(0755) 27404445
不良反应专线：(0755) 27409223
网址：http://www.szwg.com E-mail: szwg@szwg.com

输出信息：200网线

文 件 名：	静注人免疫球蛋白说明书（V1.2）
颜 色：	K
尺 寸：	180x250mm
材质描述：	70g进口丽印书纸